

令和7年度 農作物病害虫	防除対策情報 第3号	令和7年5月27日 秋田県病害虫防除所
-----------------	------------	------------------------

園地への果樹カメムシ類の飛来に注意

～ 飛来数が多い場合は直ちに薬剤を散布してください ～

1. 現在までの発生状況と今後の発生予想

りんご防除適期決定ほ（4地点）のチャバネアオカメムシのフェロモントラップにおける5月1～4半旬の誘殺数の合計は124頭（平年73.6頭）で多かった（表－1）。

なし防除適期決定ほ（3地点）のチャバネアオカメムシのフェロモントラップにおける5月1～4半旬の誘殺数の合計は120頭（平年56.9頭）で多かった（表－2）。

5月22日に仙台管区気象台が発表した1か月予報では、向こう1か月の気温は高いと予報されている。

以上のことから、今後、果樹カメムシ類（クサギカメムシ、チャバネアオカメムシ）の活動が活発になり、園地への飛来数が多くなると予想される。

2. 防除対策

1) 園地への果樹カメムシ類の飛来数は地域による差が大きいため、飛来状況をよく観察する。特に山間部や山林に隣接する園地では注意が必要である。

2) 成虫（図－1、2）が次々に飛来し、被害が懸念される場合には、各樹種ごとに表－3～7の薬剤で直ちに防除を実施する。


3. 資料

表－1 りんご防除適期決定ほのチャバネアオカメムシのフェロモントラップにおける果樹カメムシ類誘殺数(5月1～4半旬)

	大館市	由利本荘市	美郷町	横手市	合計
本年	23	10	21	70	124
平年	4.6	10.7	11.3	47.0	73.6
概評	多	並	やや多	多	多

表－2 なし防除適期決定ほのチャバネアオカメムシのフェロモントラップにおける果樹カメムシ類誘殺数(5月1～4半旬)

	大館市	三種町	男鹿市	合計
本年	72	8	40	120
平年	37.4	6.2	13.3	56.9
概評	やや多	並	多	多



図－１ クサギカメムシ成虫



図－２ チャバネアオカメムシ成虫

表－３ りんごのカメムシ類防除薬剤一覧

RACコード	農薬名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	各成分の総使用回数
3A	イカズチWDG	1,500倍	収穫前日まで	2	2
	バイスロイドEW	2,000倍	収穫7日前まで	4	4
	ロディー水和剤	1,000倍	収穫前日まで	2	ア
4A	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	収穫7日前まで	2	2
	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	3	イ
	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	3	イ
	ダントツ水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	3	3

ア:フェンプロパトリン(7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内)) イ:ジノテフラン(3回以内)

表－４ なしのカメムシ類防除薬剤一覧

RACコード	農薬名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	各成分の総使用回数
1B	スミチオン水和剤40	800倍	有袋栽培 収穫14日前まで	6	6
			無袋栽培 収穫21日前まで		
4A	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	3	3
	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	3	ア
	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	3	ア
	ダントツ水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	3	3
	バリアード顆粒水和剤	2,000倍	収穫前日まで	3	3
	アドマイヤー顆粒水和剤	10,000倍	収穫3日前まで	2	2

ア:ジノテフラン(3回以内)

表－5 もものカメムシ類防除薬剤一覧

RACコード	農薬名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	各成分の総使用回数
3A	テルスター水和剤	1,000倍	収穫14日前まで	2	2
	アグロスリン水和剤	2,000倍	収穫前日まで	5	5
4A	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	3	3
	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	3	ア
	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	3	ア
	ダントツ水溶剤	2,000倍	収穫7日前まで	3	3

ア:ジノテフラン(3回以内)

表－6 おうとうのカメムシ類防除薬剤一覧

RACコード	農薬名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	各成分の総使用回数
4A	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	2	ア
	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	2	ア
	ダントツ水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	2	2

ア:ジノテフラン(2回以内)

表－7 うめのカメムシ類防除薬剤一覧

RACコード	農薬名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	各成分の総使用回数
4A	アルバリン顆粒水溶剤 ^{*1}	2,000倍	収穫前日まで	3	ア
	スタークル顆粒水溶剤 ^{*1}	2,000倍	収穫前日まで	3	ア

ア:ジノテフラン(3回以内)

*1:作物名「小粒核果類」での登録

【 問合せ先 】

秋田県病害虫防除所	TEL	018-881-3660
秋田県果樹試験場	TEL	0182-25-4224
かづの果樹センター	TEL	0186-25-3231
天王分場チーム	TEL	018-878-2251
掲載HP https://www.pref.akita.lg.jp/bojo/		